

# Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche



INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX



DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

## Bulletin phytosanitaire hebdomadaire N° 33

Du 16 au 22/05/2016

**Régions Nord:** Temps devenant progressivement voilé et pré-orageux durant les journées du mardi et mercredi sur l'Ouest et le Centre. Quelques foyers orageux isolés seront enregistrés le jeudi à l'Est notamment vers l'intérieur et les Aures.

Les températures maximales varieront entre **20 et 26°C** sur les régions côtières et entre **26° et 32°C** en général atteignant des pics entre 27 et 29°C vers Relizane, chlef, Soukahras et Tebessa le mardi et mercredi.

Les vents seront faibles à modérés.

**Régions Sud:** Temps voilé avec tendance orageuse le mardi et le mercredi sur le Nord Saoura, Nord Sahara et les Oasis.

Les températures maximales varieront entre **28° et 34°C** sur Tindouf, Bechar, Ghardaïa et le Hoggar/Tassili; de **36° à 42C** au Sud d'Adrar, le Sahara Central, les Oasis et le Sahara Oriental, atteignant des pics de 44°C vers in Salah, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Les vents seront modérés à assez forts engendrant ainsi des soulèvements de sable sur la Saoura, le Sahara Central, le Nord Sahara et les Oasis pouvant atteindre les régions de l'intérieur et les hauts plateaux d'Ouest en Est.

La situation phytosanitaire se présente comme suit :

Spécifications	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<b>Agrumes</b>	Centre Ouest Est	- Chute des pétales à nouaison (variétés précoces)  - Floraison à chute des pétales (variétés de saison)	Cochenilles Pucerons Mineuse Gommose Acariens Aleurodes	Anthracnose Gommose Pucerons Acariens Aleurodes Cochenille	- Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).
<b>Olivier</b>	Centre Ouest Est Sud	- Floraison à chute des pétales	Tavelure Psylle Teigne Thrips Aleurodes	Tavelure Psylle Teigne Thrips Aleurodes	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  Mise en place des pièges à phéromones contre teigne
<b>Arbres fruitiers (pépins) Pommier/ Poirier</b>	Centre Ouest Est	-Nouaison à grossissement des fruits (variétés précoces) - Floraison à chute des pétales (variétés de saison)	Tavelure Carpocapse Feu bactérien Oidium Pucerons	Tavelure Pucerons Carpocapse Oidium	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  -Traitement ovicide et larvicide contre carpocapse.  -Surveillance du feu bactérien

Spéculations	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<b>Arbres fruitiers (noyaux)</b>	Centre Ouest Est	- Début maturité à maturité (variétés précoces)	Moniliose Corynéum Pucerons Cératite	Moniliose Corynéum Pucerons	- Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).
<b>Vigne</b>	Centre Ouest Est	- floraison à nouaison	Mildiou Oidium Eudémis	Acarien Oidium Mildiou	- Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).
<b>Pomme de terre</b>	Ouest Est Centre	- Grossissement des tubercules à maturation (primeur)  - Grossissement des tubercules	Mildiou Alternaria Teigne Mauvaises herbes	Mildiou Alternaria Teigne	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  -Respect du DAR
<b>Tomate sous serre</b>	Ouest  Sud  Centre  Est	7 <sup>ème</sup> à 14 <sup>ème</sup> bouquet  8 <sup>ème</sup> à 11 <sup>ème</sup> bouquet  3 <sup>ème</sup> à 6 <sup>ème</sup> bouquet  4 <sup>ème</sup> à 6 <sup>ème</sup> bouquet	Mineuse Mildiou Botrytis Alternaria Acariens Aleurodes Noctuelles	Mildiou Mineuse Botrytis Alternaria Acariens Aleurodes Noctuelles	-Traiter si justifié en fonction de la durée d'action du produit (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  -Respecter les mesures d'hygiène et d'entretien.  -Renouvellement des phéromones contre mineuse (phéromones de <i>Tuta Absoluta</i> disponibles et gratuites au niveau des SRPV et IPW des Wilayas concernées).
<b>Céréales</b>	Centre Ouest Est  Sud	- Epiaison à laiteux pâteux (majorité des wilayas)    - Moisson battage	Maladies foliaires Fusariose Pucerons Rouilles Criocère	Maladies foliaires Fusariose Criocère Pucerons Rouilles Punaise Nématodes Acarien Thrips Cicadelle	-Surveillance régulière et traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).    -Respect du DAR
<b>Palmier Dattier</b>	Sud	- Nouaison	Cochenille blanche Boufaroua	Cochenille blanche	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  -traitement contre Boufaroua dans les wilayas précoces.  -Respect des mesures d'entretien.