

# Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche



INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX



DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

## Bulletin phytosanitaire hebdomadaire N° 36

Du 06/06 au 12/06/2016

**Régions Nord:** le temps sera généralement brumeux et nuageux durant les matinées puis dégagé durant les après midi sur les régions côtières avec formation orageuse vers l'intérieur, les hauts plateaux et les Aurès.

Sur les régions côtières, les températures maximales varieront entre 24°C et 27°C à l'Est et entre 26°C et 30°C à l'Ouest et au Centre. Par contre sur les régions de l'intérieur et les hauts plateaux, elles varieront entre 28°C et 38°C avec des pics de 40°C sur Relizane, Chlef, Mascara, Sidi bel Abbès et Saida

Les vents seront faibles à modérés.

**Régions Sud:** un temps voilé à localement nuageux avec tendance orageuses durant les après midi l'extrême sud vers le Hoggar/tassili et le Sahara oriental.

Les températures maximales varieront entre 36° et 42°C sur l'ensemble des régions sahariennes, entre 33 °C et 37°C sur le Hoggar/Tassili. Les vents seront modérés à assez forts la Saoura, le Sahara Central et oriental

La situation phytosanitaire se présente comme suit :

Spécifications	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<b>Agrumes</b>	Centre Ouest Est	- nouaison à grossissement des fruits	Cochenilles Pucerons Mineuse Gommose Acariens Aleurodes	Pucerons Acariens Aleurodes Cochenilles	- Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).
<b>Olivier</b>	Centre Ouest Est Sud	- grossissement des fruits (variétés précoces)  -Chute des pétales-nouaison (variétés tardives)	Tavelure Psylle Teigne Thrips Aleurodes mouche	Psylle Teigne Tavelure	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  Mise en place des pièges à phéromones contre la teigne et la mouche de l'olive (variétés précoces)
<b>Arbres fruitiers (pépins) Pommier/ Poirier</b>	Centre Ouest Est	- véraison (variétés précoces) - grossissement des fruits nouaison (variétés de saison)	Tavelure Carpocapse Feu bactérien Oidium Pucerons	Pucerons Carpocapse	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  -Traitement ovicide et larvicide contre carpocapse.  -Surveillance du feu bactérien

Spécifications	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<b>Arbres fruitiers (noyaux)</b>	Centre Ouest Est	- grossissement des fruits à début maturité (variétés de saison)	Moniliose Corynéum Pucerons Cératite capnode	capnode	- Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV). - capnodage ou ramassage manuel des adultes afin de réduire le nombre des populations.
<b>Vigne</b>	Centre Ouest Est	- développement des baies (variétés précoces)  -nouaison (variétés de saison)	Mildiou Oidium Eudémis Altise puccerons	Oidium Mildiou Altise	- Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).
<b>Pomme de terre</b>	Ouest Est Centre	- Grossissement des tubercules à maturation (saison)	Mildiou Alternaria Teigne Mauvaises herbes	Teigne	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV). -Respect du DAR
<b>Tomate sous serre</b>	Ouest  Sud  Centre  Est	17 <sup>ème</sup> à récolte  11 <sup>ème</sup> bouquet-récolte  4 <sup>ème</sup> à 7 <sup>ème</sup> bouquet  8 <sup>ème</sup> bouquet-récolte	Mineuse Mildiou Botrytis Alternaria Acariens Aleurodes Noctuelles	Mildiou Mineuse	-Traiter si justifié en fonction de la durée d'action du produit (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  -Respecter les mesures d'hygiène et d'entretien.  -Renouvellement des phéromones contre mineuse (phéromones de <i>Tuta Absoluta</i> disponibles et gratuites au niveau des SRPV et IPW des Wilayas concernées).
<b>Céréales</b>	Centre Ouest Est  Sud	L'opération moisson battage est en cours dans la majorité des wilayas céréalières	-	-	-
<b>Palmier Dattier</b>	Sud	- grossissement des fruits	Cochenille blanche Boufaroua	-	-Traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).  -traitement contre Boufaroua dans les wilayas précoces.  -Respect des mesures d'entretien.