






Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche

INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX




DIRECTION D'APPUI TECHNIQUE







Bulletin Phytosanitaire Hebdomadaire N°07 Du 29/10 au 04/11/2018

<i>Régions</i> <i>Données météorologiques</i>	<i>Temps</i> 	<i>Températures</i> 	<i>Vent</i> 
<i>Régions Nord</i>	Temps partiellement voilé à nuageux avec quelques pluies résiduelles en générale. Temps devenant plus en plus nuageux accompagné des pluies orageuses le jeudi sur les régions côtières, l'intérieur et les Hauts Plateaux.	Températures maximales légèrement en baisse, varieront entre 10° et 25°C Températures minimales avoisineront localement 2°C du lundi au mardi atteignant 12°C le mercredi sur les Hauts Plateaux et les Aurès.	Les vents seront modérés à assez forts sur les régions côtières.
<i>Régions Sud</i>	Temps dégagé à voilé sur toutes les régions sahariennes. à l'exception sur l'extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sahara oriental et les Oasis, le temps sera voilé à nuageux avec quelques pluies sous forme d'averses orageuses du mardi au jeudi.	Températures maximales varieront entre 18° et 26°C du Sud Ouest vers le Nord Sahara et les Oasis Et entre 24° et 34°C sur les autres régions Sahariennes avec un pic 36/38°C sur l'extrême Sud	Les vents seront modérés à assez forts sur le Sahara Central, et l'extrême Sud vers le Sahara Oriental, Central et les Oasis, avec des soulèvements

			de sable.
--	--	--	-----------

<i>Spécifications</i>	<i>Régions</i>	<i>Stades phénologiques</i>	<i>Risques</i>	<i>Signalisations de la semaine</i>	<i>Recommandations</i>
<p><i>Céréales</i></p> 	<p>Centre Ouest Est</p>	<p>Démarrage de la campagne labour-semences</p>	<p>Merione des champs</p>	<p>—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Préparation du sol ◆ Traitement de semence contre le ver blanc et les maladies fongiques.
<p><i>Pomme de terre</i></p> 	<p>Centre Ouest Est</p>	<p>Développement végétatif à tubérisation</p>	<p>Mildiou Alternariose Teigne Noctuelles</p>	<p>Mildiou Acariens Teigne Alternariose</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Surveillance et traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV). ◆ Respect des mesures prophylactiques
<p><i>Tomate plein champ (Arrière saison)</i></p> 	<p>Ouest Est Centre</p>	<p>2^{ème} à 4^{ème} Bouquet floral</p>	<p>Mineuse Mildiou Alternariose Aleurodes Pucerons Acariens</p>	<p>Mineuse Pourriture grise</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Surveillance des bio-agresseurs à risque (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV). ◆ Respect des mesures prophylactiques. Respect du DAR

<p><i>Tomate sous serre</i></p> 	<p>Ouest Centre Sud</p>	<p>Repiquage à 1^{er} Bouquet floral</p>			
---	-----------------------------	--	--	--	--

Spécifications	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<p><i>Agrumes</i></p> 	<p>Centre Ouest Est</p>	<p>Grossissement des fruits à pré maturité.</p>	<p>Mineuse Aleurodes Cératite Acariens Pucerons</p>	<p>Aleurodes Mineuse Cératite Cochenille Puceron</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Surveillance et traitement des ravageurs dès apparition des premières colonies. ◆ Premier traitement contre la cératite pour les variétés précoces.
<p><i>Olivier</i></p> 	<p>Centre Ouest Est Sud</p>	<p>Grossissement des fruits à pré maturité</p>	<p>Mouche de l'olive Teigne Cochenille noire Psylle Tuberculose</p>	<p>Mouche de l'olive Œil de paon Teigne Tuberculose Pyrale du jasmin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Surveillance et traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV). ◆ Traitement contre la mouche de l'olive
<p><i>Rosacées fruitières à pépins (Pommier et Poirier)</i></p> 	<p>Centre Est Ouest</p>	<p>Poursuite récolte (variété tardive)</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entretien des vergers récoltés.

<p><i>Rosacées fruitières à noyaux</i> (Pêcher et Amandier)</p> 	<p>Centre Est Ouest</p>	<p>Poursuite récolte (variété tardive)</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Entretien des vergers récoltés</p>
<p><i>Vigne</i></p> 	<p>Centre Est Ouest</p>	<p>Récolte (variété tardive)</p>			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Respect du DAR ◆ Entretien des vergers récoltés
<p><i>Palmier Dattier</i></p> 	<p>Sud</p>	<p>Maturité à récolte</p>	<p>Pyrale Cochenille blanche Meylois</p>	<p>Pyrale Cochenille blanche Meylois</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nettoyage et entretien des lieux de stockage.