






# Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche





INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

DIRECTION D'APPUI TECHNIQUE





## Bulletin Phytosanitaire Hebdomadaire N°33 Du 29/04 au 05/05/2019

<i>Régions</i>  <i>Données météorologiques</i>	<i>Temps</i> 	<i>Températures</i> 	<i>Vents</i> 
<i>Régions Nord</i>	<p>Après dissipation des bancs de brume près des côtes et dans les vallées les débuts de matinée, le temps sera généralement dégagé;</p> <p>Sur l'Intérieur et les hauts plateaux Ouest et Centre, le temps sera voilé à nuageux devenant progressivement nuageux le jeudi, occasionnant quelques pluies orageuses.</p>	<p>Les températures maximales varieront entre <b>18° et 26°C</b> sur les régions côtières et entre <b>22° et 30°C</b> sur les régions intérieures, Hauts Plateaux et les Aurès avec un pic de <b>32°C</b> le jeudi sur les régions de l'Intérieure Ouest.</p>	<p>les vents seront faibles à modérés parfois assez forts à forts sur les Hauts Plateaux Ouest et Centre.</p>
<i>Régions Sud</i>	<p>Temps dégagé à partiellement voilé, devenant de plus en plus nuageux avec une tendance orageuse le mercredi sur toutes les régions sahariennes.</p>	<p>Les températures maximales varieront entre <b>32° et 38°C</b> en général avec un pic de <b>42°C</b> sur l'extrême Sud.</p>	<p>Les vents seront faibles à modérés, se renforçant à partir du mercredi sur le Sud Ouest, le Nord Sahara et les Oasis avec soulèvements de sable.</p>

<i>Spéculations</i>	<i>Régions</i>	<i>Stades phénologiques</i>	<i>Risques</i>	<i>Signalisations de la semaine</i>	<i>Recommandations</i>
<b>Céréales</b> 	<b>Centre Ouest Est Sud</b>	Montaison à épisaison Prés maturité à récolte	Maladies foliaires Fusariose Pucerons Rouilles Criquet marocain Punaise Criocère	Maladies foliaires Fusariose Pucerons Criocère Criquet marocain Rouilles  Punaise	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆ Vigilance contre le criquet marocain et la punaise.</li> </ul>
<b>Pomme de terre</b> 	<b>Centre Ouest Est</b>	Développement végétatif à tubérisation (saison)	Mildiou Alternariose Pucerons Teigne	Mildiou Alternariose	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>
<b>Tomate plein champ(industrielle)</b> 	<b>Annaba Guelma Skikda et El Tarf</b>	Repiquage	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques.</li> <li>• Respect du DAR</li> </ul>
<b>Tomate sous serre</b> 	<b>Ouest et Sud Centre et Est</b>	7 <sup>me</sup> à 10 <sup>me</sup> Bouquet floral 4 <sup>me</sup> à 6 <sup>me</sup> Bouquet floral	Mineuse Mildiou Alternariose Pourriture grise Thrips Pucerons	Mineuse Mildiou Alternariose Noctuelles Pucerons	

Spécifications	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<p><i>Agrumes</i></p> 	Centre Ouest Est	Développement des pousses à floraison	Mineuse Cochenilles Pucerons Aleurodes	Aleurodes Pucerons	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance et traitements/signalisations avant floraison (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>
<p><i>Olivier</i></p> 	Centre Ouest Est Sud	Bouton floraux à différenciation des corolles	Tavelure Teigne Psylle	Tavelure Teigne Psylle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>
<p><i>Rosacées fruitières à noyaux (Pêcher et Amandier)</i></p> 	Centre Ouest Est Sud	Floraison à grossissement	Cloque du pêcher Moniliose du pêcher Pucerons Capnode	Cloque du pêcher Moniliose du pêcher Pucerons Capnode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>Traitement et capnodage.</li> </ul>
<p><i>Rosacées fruitières à pépins (Pommier et Poirier)</i></p> 	Centre Ouest Est Sud	Floraison à grossissement	Tavelure Psylle Carpocaps Pucerons	Tavelure Psylle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>
<p><i>Vigne</i></p> 		Feuilles étalées à grappe visibles	Oidium Mildiou Altise	Oidium	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>

<p><i>Néflier</i></p> 	<p>Centre Ouest Est Sud</p>	<p>Maturité à récolte</p>	<p>Tavelure Feu Bactérien</p>	<p>Tavelure Feu Bactérien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>
<p><i>Palmier Dattier</i></p> 	<p>Sud</p>	<p>Nouaison Emergence des spathes à nouaison</p>	<p>Pourriture du cœur  Bayoud  Cochenille blanche</p>	<p>Cochenille blanche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitements/signalisations (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆</li> </ul>

INPV