








# Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche





INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

DIRECTION D'APPUI TECHNIQUE

## Bulletin Phytosanitaire Hebdomadaire N°10 Du 25/11 au 01/12/2019

<i>Régions</i>  <i>Données météorologiques</i>	<i>Temps</i> 	<i>Températures</i> 	<i>Vent</i> 
<i>Régions Nord</i>	Temps sera généralement dégagé à partiellement voilé, alternance d'éclaircies et de passage nuageux le mardi avec quelques pluie sur les régions côtières Est	Températures maximales saisonnières varieront entre <b>18 et 24°C</b> sur les régions côtières et entre <b>14° et 21°C</b> sur les régions intérieures, Hauts Plateaux et les Aurès.	Les vents seront faibles à modérés
<i>Régions Sud</i>	Temps sera dégagé à partiellement en générale	Températures maximales seront entre <b>18°et 28°C</b> en général atteignant <b>30°</b> et <b>34 °C</b> sur l'extrême Sud.	Les vents seront faibles à modéré.

<i>Spécifications</i>	<i>Régions</i>	<i>Stades phénologiques</i>	<i>Risques</i>	<i>Signalisations de la semaine</i>	<i>Recommandations</i>
<p><i>Céréales</i></p> 	Centre Ouest Est	Poursuite des opérations de semis	Mérione de Shaw Sautereaux	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Préparation du sol</li> <li>◆ Traitement de semence contre le ver blanc et les maladies transmises par semence.</li> <li>◆ Surveillance et traitement contre la mérione de Shaw (régions Est et Ouest).</li> <li>◆ Surveillance et traitement contre les sautereaux (Sud de Biskra et Khenchela).</li> </ul>
<p><i>Pomme de terre</i></p> 	Centre Ouest Est	Développement végétatif à tubérisation	Teigne		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance des bio-agresseurs à risque (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques</li> </ul>
<p><i>Tomate plein champ (Arrière saison)</i></p> 	Ouest Est Centre	3 <sup>ème</sup> à 5 <sup>me</sup> Bouquet floral	Mineuse Alternariose Aleurodes	Mineuse Alternariose Aleurodes	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance des bio-agresseurs à risque (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques.</li> <li>◆ Respect du DAR.</li> </ul>
<p><i>Tomate sous serre</i></p> 	Ouest Centre SUD	Repiquage à 2 <sup>me</sup> Bouquet floral	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques</li> </ul>

Spéculations	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<p><i>Olivier</i></p> 	Centre Ouest Est Sud	Maturité des fruits à début récolte	Mouche de l'olive Teigne	Mouche de l'olive Teigne	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>
<p><i>Agrumes</i></p> 	Centre Ouest Est	Maturité des fruits à début récolte.	Mineuse Aleurodes Cératite	Aleurodes Mineuse Cératite	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆ Traitement contre la cératite pour les variétés Semis tardive</li> <li>◆ Respect du DAR</li> </ul>
<p><i>Néflier</i></p> 	Centre Est Ouest	Apparition des boutons floraux	Tavelure Feu Bactérien	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance de la tavelure et traitement dès apparition des symptômes</li> </ul>
<p><i>Palmier Dattier</i></p> 	Sud	Récolte (Deglet Nour)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Entretien des palmeraies après la récolte</li> </ul>