



وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني

الكشف الأسبوعي للصحة النباتية رقم 11
من 20 إلى 2021/12/26

الرياح	درجة الحرارة	الطقس	المناطق العوامل المناخية
			
الرياح المرتقبة تكون معتدلة عموما.	نترقب درجات حرارة قصوى تتراوح بين 16°م و 24°م على مستوى المناطق الساحلية ومن 16°م إلى 20°م على المناطق الداخلية. الهضاب العليا والأوراس. لتصل 22 / 24°م على المناطق الداخلية لغرب البلاد. بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا تقارب الصفر درجة مئوية على مستوى الهضاب العليا و الأوراس.	باستثناء بعض الضباب المحلي مع سحب سفلى في الصباح . الجو سيكون صحو إلى غائم جزئيا على شمال البلاد طيلة أيام الأسبوع.	المناطق الشمالية
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة. تكون قوية نسبيا وهذا على أقصى الجنوب مع تطاير للرمال.	درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين 22°م و 28°م منى أقصى الجنوب إلى الصحراء الوسطى ومنطقة تندوف. وبين 16°م و 21°م على مستوى المناطق الأخرى .	تكون الأجواء صحو إلى غائمة جزئيا عموما. بعض السحب العابرة تتشكل يوم الثلاثاء دون فعالية على مستوى الجنوب الغربي. الصحراء الوسطى و الجنوب الأقصى إلى الصحراء الشرقية .	المناطق الجنوبية

التوصيات	الابلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	الشعبة الفلاحية
<ul style="list-style-type: none"> ◆ معالجة البذور ضد الدودة البيضاء والأمراض المتنقلة عن طريق البذور ◆ المراقبة والمعالجة ضد فار الحقول على مستوى محيط حقول الحبوب. ◆ مراقبة الدودة البيضاء ابتداء من مرحلة الإنبات والمعالجة الموضعية عند الظهور. ◆ القيام بعملية التعشيب في حقول الحبوب في المناطق الجنوبية (ادرار). 	فار الحقول الدودة البيضاء	القوارض الزراعية الجراد المحلي الدودة البيضاء	الحرث و البذر 01 الى 03 أوراق 03 أوراق الى الاشطاء	غرب وسط شرق جنوب	الحبوب 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ مراقبة حشرة البرغوث و خنفساء الأرض على السلجم الزيتي. 	—	الأعشاب الضارة حشرة البرغوث خنفساء الأرض	الحرث و البذر 02 الى 04 أوراق	وسط	السلجم الزيتي 
		دودة الذرى الفراشات الليلية	نضج -الجنبي	الجنوب	الذرى 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV 	حفارة الطماطم	حفارة الطماطم اللفحة المبكرة	الغرس-04باقة زهرية	غرب جنوب (بسكرة)	الطماطم المحمية 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 		البياض الزغبي فراشة البطاطا الالترناريوز	من تكوين إلى تضخم الدرنات من النضج إلى الجنبي	وسط شرق غرب	البطاطا البعد الموسمية 

IMP.V

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	Recommandations
<ul style="list-style-type: none"> المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV). احترام الفترة ما قبل الجني 		<p>حفارة الأنفاق العناكب القشريات ذبابة الفواكه</p>	نضج الثمار-الجني	وسط غرب شرق	<p>الحمضيات.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) احترام الفترة ما قبل الجني 		<p>فراشة الزيتون ذبابة الزيتون حشرة الزيتون القطنية فراشة الياسمين مرض دبول الزيتون</p>	نضج الثمار--الجني	غرب وسط شرق	
<ul style="list-style-type: none"> مراقبة مرض التبقع والتدخل بمجرد ظهور أولى الأعراض 		مرض التبقع	الإزهار - سقوط البتلات	غرب وسط شرق	<p>الزعرور</p> 
<ul style="list-style-type: none"> استعمال المعالجة الشتوية لأشجار الفواكه و الكروم بعد الزير احترام الإجراءات الاحترازية بعد الجني. 	—	—	السبات النباتي	غرب وسط شرق	<p>أشجار لفواكه و الكروم</p> 
<ul style="list-style-type: none"> تحضير أماكن التخزين. تنظيف بساتين النخيل التي تم الجني فيها(المناطق الجنوبية المبكرة) 	القشريات البيضاء الخنفساء وحيدة القرن	القشريات البيضاء	الجني السبات الشتوي (الأصناف المبكرة)	جنوب	<p>أشجار النخيل</p> 

IMP.V