



وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني



الكشف الأسبوعي للصحة النباتية رقم 24
من 03/01 إلى 2021/03/07

الرياح	درجة الحرارة	الطقس	المناطق العوامل المناخية
			
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة عموماً.	تترقب درجات حرارة قصوى موسمية تتراوح بين 09°م و 22°م على مستوى المناطق الساحلية والداخلية لتصل إلى 26/25°م على المناطق الداخلية الغربية. و من 8°م إلى 20°م على الهضاب العليا و الأوراس.	طقس غائم على العموم يسود شمال البلاد طيلة الأسبوع. مع تساقط لبعض الأمطار المتفرقة على السواحل والمناطق الداخلية.	المناطق الشمالية
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة. تكون قوية نسبياً على تيندوف. شمال الصحراء. الصحراء الوسطى و أقصى الجنوب مع تطاير للرمال.	درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين 22°م و 28°م بالصحراء الوسطى و الشرقية لتصل إلى 32/31°م على أقصى الجنوب و من 12°م إلى 2018°م في باقي المناطق الأخرى	طقس غائم محلياً مع تساقط لبعض الأمطار المتفرقة تكون رعدية أحياناً على شمال الصحراء و الواحات. يوم الثلاثاء والأربعاء. ما عدا ذلك. تكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق الصحراوية الأخرى.	المناطق الجنوبية

التوصيات	الابلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	الشعبة أفلاحيه
<ul style="list-style-type: none"> ◆ مراقبة الدودة البيضاء ابتداء من مرحلة الإنبات والمعالجة الموضعية عند الظهور. ◆ مراقبة الدودة السلكية على الحبوب ابتداء من مرحلة الإنبات. ◆ المراقبة والمعالجة ضد فار الحقول على مستوى محيط حقول الحبوب. ◆ القيام بعملية التعشيب في حقول الحبوب على مستوى المناطق الجنوبية و الشمالية ◆ مراقبة الأمراض الفطرية في حقول الحبوب (ادرار)؛ 	<p>فار الحقول الدودة البيضاء الأمراض الفطرية على الأوراق</p>	<p>فار الحقول الدودة البيضاء الأعشاب الضارة الأمراض الفطرية على الأوراق حشرة المن</p>	<p>الاشطاء (المناطق المتأخرة) الاشطاء إلى خروج السنبله (ادرار)</p>	<p>غرب وسط شرق جنوب</p>	<p>الحبوب</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ مراقبة حشرة البرغوث و خنفساء الأرض على السلجم الزيتي. 	<p>حشرة البرغوث خنفساء الأرض</p>	<p>الأعشاب الضارة حشرة البرغوث خنفساء الأرض</p>	<p>6 إلى 9 أوراق</p>	<p>وسط غرب شرق</p>	<p>السلجم الزيتي</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية ◆ احترام الفترة ما قبل الجني. ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	<p>اثار حفارة الطماطم اثار البياض الزغبي اللفحة المبكرة اثار الفراشة الليلية الفوزاريوز</p>	<p>حفارة الطماطم البياض الدقيقي الذبابة البيضاء الالترناريوز التعفن الرمادي</p>	<p>الانبات الى 8 باقات زهرية 6 باقات زهرية إلى النضج</p>	<p>غرب شرق وسط جنوب (بسكرة)</p>	<p>الطماطم المحمية</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ المراقبة والمعالجة مند ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	<p>أولى الأعراض البياض الزغبي (مستغنام)</p>	<p>البياض الزغبي</p>	<p>الغرس إلى الإنبات</p>	<p>غرب</p>	<p>البطاطا الموسمية</p> 

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	Recommandations
<ul style="list-style-type: none"> المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) احترام الفترة ما قبل الجني 	حفارة الحمضيات	الذبابة البيضاء ذبابة الفواكه حفارة الحمضيات	من نضج الثمار إلى الجني	وسط شرق غرب	<p>الحمضيات</p> 
<ul style="list-style-type: none"> المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 		تجدد أوراق الخوخ	من خروج البراعم إلى الإزهار	غرب وسط شرق جنوب	<p>أشجار الفواكه (اللوزيات)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> استعمال المعالجة الشتوية لأشجار الفواكه و الكروم بعد الزير احترام الإجراءات الاحترازية بعد الجني.. 	—	—	السبات النباتي	غرب وسط شرق	<p>أشجار الفواكه (اللوزيات) والكروم</p> 
<ul style="list-style-type: none"> مراقبة مرض التبقع والتدخل بمجرد ظهور أولى الأعراض 		مرض التبقع	من تشكل العقد إلى تضخم الثمار	غرب وسط شرق	<p>الزعرور</p> 
<ul style="list-style-type: none"> مراقبة تعفن أزهار طلع النخيل (الخامج) في مناطق الإنتاج المبكرة للتمور. 		تعفن أزهار طلع النخيل (الخامج)	تفتح أزهار الطلع	جنوب	<p>أشجار النخيل</p> 

IMP.V